

## くすりのしおり

621360701

2011年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**商品名：ムーベン配合内用剤**

主成分：塩化ナトリウム（Sodium chloride）  
 塩化カリウム（Potassium chloride）  
 炭酸水素ナトリウム（Sodium bicarbonate）  
 無水硫酸ナトリウム（Sodium sulfate anhydrous）

剤形：白色の散剤

シート記載：経口腸管洗浄剤、ムーベン配合内用剤、137.155g

**この薬の作用と効果について**

内服の腸管洗浄剤であり、腸管の内容物の排除・洗浄効果を示します。

通常、大腸内視鏡検査、大腸手術時の前処置における腸管内容物の排除に用いられます。

**次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。**

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。胃腸管閉塞症、腸閉塞の疑い、腸管穿孔、中毒性巨大結腸症、便秘、腹部手術後、狭心症、心筋梗塞、糖尿病がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

**用法・用量（この薬の使い方）**

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入

- ・ 散剤の入ったプラスチック容器に水を約半分くらい加えて散剤を溶かした後、水を約2Lの線まで入れて振り混ぜ、溶解液とします。

通常、成人は1回2～4Lを1時間あたり約1Lの速度で服用します。ただし、飲み始めのコップ（約180mL）2～3杯目までは特にゆっくり（1杯を15分以上かけて）服用します。その後もゆっくり服用します。

**大腸内視鏡検査前処置：**

（検査当日の場合）当日の朝食は絶食（水分摂取のみ可）とし、検査開始予定時間の約4時間前から服用します。

（検査前日の場合）前日の夕食後は絶食（水分摂取のみ可）とし、夕食後約1時間以上経過後から服用します。前日の朝食、昼食は残渣の少ないもの、夕食は固形物の入っていない液状食としてください。

**大腸手術前処置：**

手術前日の昼食後は絶食（水分摂取のみ可）とし、昼食後約3時間以上経過後から服用します。

いずれの場合も排便を確認し、排泄液が透明になった時点で服用を終了します。

4Lを超えることはありません。必ず指示された溶かし方、飲み方に従ってください。

- ・ 飲んでいいる時に、腹痛、吐き気、嘔吐、顔が青ざめる、めまい、寒気、じんましん、息苦しさ、顔のむくみなどがあらわれた場合には、服用を中止し、直ちに医師または薬剤師に連絡してください。服用後にこれらの症状があらわれた場合にも、直ちに医師または薬剤師に連絡してください。2L服用しても排便がない場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に連絡してください。
- ・ 自宅で服用する場合は、副作用があらわれた時の対応がとれるように、ご家族などがおられるところで服用してください。
- ・ 服用前日および当日いずれも排便がない場合は、この薬を飲まずに、医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 飲み忘れた場合は担当の医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

※次ページも必ずお読みください。

## 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、腹部膨満感、吐き気、腹痛、冷感、けん怠感、ふらつき感、嘔吐などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 顔面蒼白、血圧低下、嘔吐 [ショック、アナフィラキシー様症状]
- ・ 腹痛、腹部膨満感、嘔吐 [腸管穿孔、腸閉塞、単径ヘルニア嵌頓]
- ・ 意識障害、けいれん、嘔吐 [低ナトリウム血症]
- ・ 急激な腹痛、発熱、血便 [虚血性大腸炎]
- ・ 吐き気・嘔吐、吐血、血便 [マロリー・ワイス症候群]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温を避けて保管してください。（高温になると粉末が溶け、その後固まる可能性があるため、30℃以下で保管してください。特に夏期などで高温となる自動車内などへの放置は避けてください。）
- ・ 溶解後は指示された時間に服用しますが、やむを得ずすぐに服用できない場合は冷蔵庫内に保存し、48時間以内に服用してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。