

# 風味・包装変更のお知らせ

## 経口腸管洗浄剤

指定医薬品



MUBEN®

レモン風味

謹啓 弊社製品ムーベン®につきましては、毎々格別のご高配を賜り、有り難く厚く御礼申しあげます。

さて、この度、ムーベン服用の際の受容性を高めるため、風味を変更いたしますので、ご案内申しあげます。

また、より使いやすくするため、容器の安定性、粉末の溶解性を高めています。

なお、現行品と区別するため、JANコード及び包装・表示等を変更させていただきます。

今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

敬 白

平成16年12月  
日本製薬株式会社

### ●変更時期

品 名	規格・包装	JANコード (変更になります)	製造番号	出荷予定時期
ムーベン	137.155 (プラスチック容器入り)	4987123145480	S101	2004年12月

薬価基準収載医薬品コードには変更ありません。

なお、風味変更品は、製品名の近くに **レモン風味** と表示しています。

### ●服用に関する変更点

#### 1. レモン風味で飲みやすく

服用の際の受容性を高めるため、甘味と塩辛さがわずかにあるレモン風味とし、飲みやすくなりました。

#### 2. より溶けやすく

利便性のため、より溶けやすい粒子としました。

(粒子の表面積を大きくした関係上、粉末の容積が増大しています。含量・電解質組成等に変更はありません。2頁をご覧ください。)

#### 3. 容器の安定性を高く

底面の接地面積を広くすることにより、安定性を高めました。

※流通在庫の関係から、新包装品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、何卒ご了承のほどお願い申しあげます。

## ●包装に関する変更点

風味変更品は、組箱の地色を青色から黄色に変更するとともに、プラスチック容器等の製品名の近くに「レモン風味」と表示しています。

### 現 行 品

### 変 更 品

#### 1. 組箱（10袋入）



組箱の色変更  
寸法変更



[寸法] 260mm×260mm×高さ165.5mm

260mm×260mm×高さ185.5mm

#### 2. Pケース（10袋入組箱×2）

[寸法] 291mm×546mm×高さ197mm

291mm×546mm×高さ210mm

#### 3. プラスチック容器（バッグ）



溶解性を高める関係上、粉末の容積が増大



## 4. アルミ袋（外袋）

アルミ袋へ記載の注意事項を変更しました。

現  
行  
品  
（裏面）

### ご自宅で服用される方へ

#### 1. 服用前の注意

一人で飲まないで、ご家族の方などがおられるところでお飲みください。

#### 2. 飲み始めの注意

飲み始めのコップ2～3杯目までは、特にゆっくりとお飲みください。

#### 3. 服用中、服用後の注意

(1) 服用中に、はきけ、嘔吐、腹痛、顔色が青白くなる、気分が悪い、めまい、手足が冷たくなる、じんましん、息苦しさ、顔のむくみなどの症状があらわれた場合には、飲むのを止め、直ちに医師の診療を受けてください。

(2) 服用後で、同様の症状があらわれた場合にも、直ちに医師の診療を受けてください。

#### <溶解方法>

本剤は軟質のプラスチック容器に入っています。容器に記載の溶解方法にて粉末を完全に溶解してからお飲みください。



変  
更  
品  
（裏面）

### ご自宅で服用される方へ

#### 1. 服用前の注意

(1) 服用前日あるいは服用前に排便がない方は、この薬を飲まずに、医師等に連絡し、指示に従ってください。

(2) 一人で飲まないで、ご家族の方などがおられるところでお飲みください。

#### 2. 服用方法

飲み始めのコップ2～3杯目までは、特にゆっくりとお飲みください〔コップ1杯分（約180mL）を15分以上かけてください〕。その後も同様にゆっくりとお飲みください。〔1袋全量（約2L）は、2時間以上かけてください。〕

#### 3. 服用中、服用後の注意

(1) コップ1杯飲むごとに、排便の状態や腹痛、吐き気、吐くことなどの症状がないことを確かめながらお飲みください。

約1Lを飲んでも排便がない場合には、腹痛などの症状がないことを確かめた後、引き続きお飲みください。

飲み終えても排便がみられない場合には、医師の診療を受けてください。

(2) 服用中に、顔が青ざめる、腹痛、吐き気、吐く、めまい、寒気、じんましん、息苦しさ、顔のむくみなどの症状があらわれた場合には、飲むのを止め、直ちに医療機関に連絡し、医師の診療を受けてください。

(3) 服用後に同様の症状があらわれた場合にも、直ちに医療機関に連絡し、医師の診療を受けてください。

#### <溶解方法>

本剤は軟質のプラスチック容器に入っています。容器に記載の溶解方法にて粉末を完全に溶解してからお飲みください。

## 5. 患者様向け文書「ムーベンを服用される方へ」

組箱へ10枚挿入している患者様向け文書を、レモン風味に伴う変更と「裏面」注意事項を変更するとともに、用紙の色を変更しました。


表面

### 現 行 品

#### ムーベンを服用される方へ

##### ■ムーベンの溶かし方

- ①アルミの袋を開封すると、白い粉の入ったプラスチック容器が折り畳まれて入っています。
- ②容器のキャップを開けて水を約半分くらい加え、キャップを閉め、十分に振とうさせ、粉末を溶解してください。
- ③さらに、水を約2Lの線まで加え、キャップを閉め、よく振り混ぜ、完全に溶解してください。



注意：お茶やジュース、スポーツドリンクなどで溶かさないでください。また、砂糖や香料などを加えないでください。

- ④平らな場所に置いて、容器裏面上部の約2Lの線まで水が入っていることを確認します。
- 注意：濡れている容器は、すべりやすいので、容器外側の水をふきとり、落とさないように気をつけてください。

（服用の仕方（飲み方）や服用に関する注意につきましては、裏面をご覧ください。）

##### ■ムーベンの飲み方

- ①溶解液をコップに移し（約180mL）、飲み始めのコップ2〜3杯目までは特にゆっくり（1杯を15分以上かけて）服用してください。その後も同様にゆっくり服用してください。[1袋全量（約2L）は、2時間以上かけてください。]

わずかに塩辛い味です。少し冷やした方が飲みやすくなります。



容器の口部を手を持って注いでください。注ぐとき、液が飛び出ることがあるため、少しずつ傾けてください。

- ②多くの場合、約1Lを服用したころから排便が始まり、以後数回の排便が生じますが、服用は排泄液がほぼ透明になるまで続けてください。飲み終わった後も数回排便を生じることがあります。

##### 注 意

1. 服用前の注意
  - (1) ムーベンの投与前日あるいは投与前に通常程度の排便があったことを確認し、排便がない場合には医師等に相談してください。
  - (2) 一人での服用はしないでください。
2. 服用中、服用後の注意
  - (1) 排便、腹痛などの状況を確認しながら服用してください。約1Lを服用しても排便がない場合には、腹痛、吐き気、吐くことがないことを確認した後に服用を再開してください。飲み終えても排便がみられない場合には、医師の診察を受けてください。
  - (2) 服用中に、顔が青ざめる、吐き気、吐く、めまい、寒気、じんましん、息苦しさ、顔のむくみなどの症状があらわれた場合には、飲むのを止め、直ちに医療機関に連絡し、医師の診察を受けてください。
  - (3) 服用後に同様の症状があらわれた場合にも、直ちに医療機関に連絡し、医師の診察を受けてください。

##### ■容器の廃棄について

- アルミ袋  
燃えないゴミとして廃棄してください。
- 容器（バッグ）  
プラスチック製です。お住まいの市町村の分別方法に従って廃棄してください。

裏面

### 変 更 品

#### ムーベンを服用される方へ

##### ■ムーベンの溶かし方

- ①アルミの袋を開封すると、白い粉の入ったプラスチック容器が折り畳まれて入っています。
- ②容器のキャップを開けて水を約半分くらい加え、キャップを閉め、十分に振とうさせ、粉末を溶解してください。
- ③さらに、水を約2Lの線まで加え、キャップを閉め、よく振り混ぜ、完全に溶解してください。



注意：お茶やジュース、スポーツドリンクなどで溶かさないでください。また、砂糖や香料などを加えないでください。

- ④平らな場所に置いて、容器裏面上部の約2Lの線まで水が入っていることを確認します。
- 注意：濡れている容器は、すべりやすいので、容器外側の水をふきとり、落とさないように気をつけてください。

（服用の仕方（飲み方）や服用に関する注意につきましては、裏面をご覧ください。）

##### ■ムーベンの飲み方

- ①溶解液をコップに移し（約180mL）、飲み始めのコップ2〜3杯目までは特にゆっくり（1杯を15分以上かけて）服用してください。その後も同様にゆっくり服用してください。[1袋全量（約2L）は、2時間以上かけてください。]

レモン臭および甘味と塩辛さがわずかにあります。少し冷やした方が飲みやすくなります。



容器の口部を手を持って注いでください。注ぐとき、液が飛び出ることがあるため、少しずつ傾けてください。

- ②多くの場合、約1Lを服用したころから排便が始まり、以後数回の排便が生じますが、服用は排泄液がほぼ透明になるまで続けてください。飲み終わった後も数回排便を生じることがあります。

##### 注 意

1. 服用前の注意
  - (1) ムーベンの服用前日あるいは服用前に通常程度の排便があったことを確認し、排便がない場合には医師等に相談してください。
  - (2) 一人での服用はしないでください。
2. 服用中、服用後の注意
  - (1) 排便、腹痛などの状況を確認しながら服用してください。約1Lを服用しても排便がない場合には、腹痛、吐き気、吐くことがないことを確認した後に服用を再開してください。飲み終えても排便がみられない場合には、医師の診察を受けてください。
  - (2) 服用中に、顔が青ざめる、腹痛、吐き気、吐く、めまい、寒気、じんましん、息苦しさ、顔のむくみなどの症状があらわれた場合には、飲むのを止め、直ちに医療機関に連絡し、医師の診察を受けてください。
  - (3) 服用後に同様の症状があらわれた場合にも、直ちに医療機関に連絡し、医師の診察を受けてください。

##### ■容器の廃棄について

- お住まいの市町村の分別方法に従って廃棄してください。
- アルミ袋（外袋）  
プラスチック（ポリエチレン）、金属（アルミ）製です。
  - 容器（バッグ）  
プラスチック（バッグ：ポリエチレン、ナイロン）製です。  
キャップ：ポリプロピレン