

くすりのしおり

620003536

2011年10月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：カチーフ N錠 10mg

主成分：フィトナジオン（Phytonadione）

剤形：白色～黄みの白色の錠剤、直径 9.3mm、厚さ 4.9mm

シート記載：カチーフ N、KATIV-N、10mg

**この薬の作用と効果について**

本剤の主成分であるフィトナジオンはビタミン K₁とも呼ばれ、肝臓での正常な血液凝固因子の合成に関与し、生理的な止血作用を発現します。ビタミン K が不足して起こる出血や出血しやすい状態を治療します。通常、各種薬剤投与中に起こる低プロトロンビン血症、胆道や胃腸障害に伴うビタミン K の吸収障害、新生児の低プロトロンビン血症、肝障害に伴う低プロトロンビン血症の予防および治療、ビタミン K 欠乏が推定される出血の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入 **《 》**
- ・ 通常、成人は 1 日主成分として 5～15mg、新生児出血の予防には母体に対し 10mg、薬剤投与中におこる低プロトロンビン血症、胆道や胃腸障害に伴うビタミン K の吸収障害、肝障害に伴う低プロトロンビン血症には 20～50mg を数回に分けて服用します。治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。この薬は 1 錠中に主成分 10mg を含みます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は担当の医師または薬剤師に相談してください。2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、吐き気、軟便などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。